

SOUTH TEXAS DERMATOLOGY, PLLC

GENERAL DERMATOLOGY • COSMETIC DERMATOLOGY • MOHS MICROGRAPHIC SURGERY • SKIN CANCER SURGERY

WAYNE A. FAGAN, M.D.
BOARD CERTIFIED DERMATOLOGIST
FELLOW AMERICAN SOCIETY MOHS SURGERY

NATHAN A. DAVIS, M.D.
BOARD CERTIFIED DERMATOLOGIST


La CIRUGÍA MICROGRAFICA DE MOHS

La Cirugía Micrográfica de Mohs fue desarrollada por el Dr. Frederic Mohs, cirujano e investigador del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. La Clínica de Cirugía de Mohs evalúa y trata los cánceres de piel, y el crecimiento incontrolado de células en la piel. Hay muchos tipos de cánceres de piel, incluyendo el carcinoma de células basales, la forma más común de cáncer de piel, y el carcinoma de células escamosas. La mayoría de los cánceres de piel pueden ser curados si se detectan y se tratan.

La cirugía de Mohs preserva la mayor cantidad de tejido normal posible y proporciona el mayor índice de cura. Otros tratamientos incluyen la extirpación quirúrgica, el quemado y raspado (electrodesecación y legrado), las cremas recetadas, o la radiación.

Preparación para la cirugía, lávese de la cabeza a los pies con un jabón que se llama Hibiclens dos días antes de venir a la clínica. Si el procedimiento va a ser realizado en la cara, no se ponga nada de maquillaje, incluyendo el maquillaje de ojos. Traiga varias capas de prendas de vestir cómodas. Puede consumir sus comidas regulares el día de la cirugía, incluyendo el desayuno. En la o meriendas (snacks) o bebidas para comer y beber mientras está en la sala de espera. Le sugerimos que traiga también un libro, o una revista. Como gesto de cortesía hacia todos los pacientes y el personal, pedimos que se apaguen todos los celulares en los cuartos de procedimientos. Tómese todos los medicamentos recetados que toma regularmente, excepto cualquier anticoagulante recetado. El anticoagulante es aconsejable de su médico le pedimos que pare de tomar 3-5 días antes de la cirugía. Si usted tiene un reemplazo de articulación, o un trasplante de órgano. Por favor, hable con su propio doctor antes de su cita para recibir las instrucciones y las recetas médicas. Traiga una lista completa de los medicamentos que toma actualmente, incluyendo las dosis. Traiga una lista que indique sus problemas de salud pasados y presentes y las cirugías que ha tenido. Necesitamos saber si tiene algún dispositivo/aparato implantado en el cuerpo, tal como un marcapasos o un desfibrilador. Puede venir a su cita acompañado de familiares o amigos, pero tendrán que permanecer en la sala de espera durante el procedimiento. Si va a tener cirugía en la cara, especialmente en el área del ojo, la frente, o la parte superior de la mejilla, es posible que tenga inflamación que afecte su visión. Debido a esto planea que alguien le lleve a la casa. Planea permanecer en nuestra clínica durante 2-4 horas. Una vez que se conozcan los márgenes evidentes, se realizará a continuación la reparación de un defecto. No programe nada más ese día. Si necesita cancelar su cita, por favor llámenos lo antes posible y con al menos 24 horas de antelación. Esto permitirá que programemos citas para otros pacientes.

El día de la cirugía cuando llegue, revisar con el escritorio delante de la clínica. Una vez allí en el habitación, el personal y el cirujano hablarán con usted sobre el tratamiento que va a tener. Le



SOUTH TEXAS DERMATOLOGY, PLLC


GENERAL DERMATOLOGY • COSMETIC DERMATOLOGY • MOHS MICROGRAPHIC SURGERY • SKIN CANCER SURGERY

WAYNE A. FAGAN, M.D.
BOARD CERTIFIED DERMATOLOGIST
FELLOW AMERICAN SOCIETY MOHS SURGERY

NATHAN A. DAVIS, M.D.
BOARD CERTIFIED DERMATOLOGIST

administrará anestesia local para entumecerle el área. El tejido será extirpado y enviado a nuestro Laboratorio de Mohs. Cuando el tejido sea extirpado, detendremos cualquier sangrado que pueda producirse y cubriremos el área con un vendaje. Usted esperará en la sala de espera de nuestra clínica hasta que el cirujano haya procesado y analizado el tejido. Si se observa que aún quedan células cancerosas, el cirujano extirpará las áreas involucradas. El proceso puede repetirse de esta forma tantas veces como sea necesario hasta que los márgenes sean claros o se delimiten. Una vez que extirpemos todo el cáncer, su cirujano decidirá cuál es el mejor método de cicatrización. Esto puede incluir la cicatrización natural, su cierre con puntos de sutura, o la realización de un pliegue o injerto. En raras ocasiones es necesario que un cirujano plástico repare el área. Esto dependerá del tamaño de la herida, su ubicación, y sus preferencias. Después de la cirugía

Como ocurre con toda cirugía, recibirá instrucciones para asegurar que los resultados sean óptimos para usted. Es posible que durante unos días después de la cirugía tenga dolor, cansancio/fatiga e inflamación, lo cual limitará lo que usted podrá hacer. Dependiendo de la parte del cuerpo involucrada, tendrá restricciones durante una a varias semanas. Su cirujano hablará con usted después de la cirugía. Regresará a la Clínica de Mohs o verá a su proveedor de cabecera local para que le quiten los puntos de sutura en 1 a 3 semanas, dependiendo del área. Necesitará tener seguimiento rutinario con exámenes de la piel. Usted programará estas citas aquí, con el dermatólogo que le refirió, o con su doctor de cabecera. El cirujano lo decidirá después de su visita. Todas las formas de tratamiento para el cáncer de piel dejan una cicatriz. La mayoría de las áreas cicatrizan muy bien, y muchas necesitan un año para hacerlo. Si en el futuro tiene preguntas o preocupaciones referentes a la cicatriz, debe ponerse en contacto con nuestra clínica.



SOUTH TEXAS DERMATOLOGY, PLLC

GENERAL DERMATOLOGY • COSMETIC DERMATOLOGY • MOHS MICROGRAPHIC SURGERY • SKIN CANCER SURGERY

WAYNE A. FAGAN, M.D.
BOARD CERTIFIED DERMATOLOGIST
FELLOW AMERICAN SOCIETY MOHS SURGERY

NATHAN A. DAVIS, M.D.
BOARD CERTIFIED DERMATOLOGIST

Instrucciones preoperatorias antes de su cirugía:

El uso de Hibiclens no es obligatorio, sin embargo, cuando se usa antes de la cirugía, ayuda a reducir el riesgo de infección cutánea. Consideramos que esto es muy beneficioso y seguro. Por favor, úselo a su propia discreción. Evite el contacto con los ojos, la boca y el oído interno.

Comience a lavarse 2 días antes de la cirugía de la cabeza a los pies, incluyendo el sitio quirúrgico, con un limpiador cutáneo antimicrobiano de venta libre, como Hibiclens (clorhexidina gluconato al 4%). Disponible en la mayoría de las farmacias y debería haber una marca genérica disponible; no se requieren recetas.

IMPORTANTE:

Hemos experimentado un alto aumento en el número de PACIENTES QUE NO ASISTEN a las cirugías de Mohs, debido a esto, hemos implementado una NUEVA POLÍZA.

Llamaremos con 2 días de anticipación para confirmar su cita. TODAS las citas deben ser confirmadas antes de las 2 p.m. del día anterior a la fecha de la cirugía. Si su cita cae en un lunes, tendrá hasta las 2 p.m. del viernes para confirmarla.

Su cirugía será cancelada si no se confirma antes de las 2 p.m. del día anterior.

Esta poliza es para asegurarnos de que todos los pacientes sean tratados de manera oportuna. Tenemos una larga lista de pacientes que desean ser tratados antes.

NOTA: Si usted confirma su cita y no se presenta, se le cobrará una tarifa por NO ASISTIR de \$100.

South Texas Dermatology agradece su cooperación y su negocio.